

hebben doorgemaakt, kan verbeteren, maar er bestaat een risico van cerebrale bloeding, en een dergelijke behandeling vereist een snelle aanpak in gespecialiseerd milieu („stroke unit”). Meer studies zijn noodzakelijk alvorens deze aanpak op grote schaal kan worden overwogen. Toediening van *acetylsalicylzuur* in een dosis van 160 à 300 mg per dag, alsook van *lage doses niet-gefractioneerde heparine* vermindert het risico van recidieven op korte termijn. Toediening van *niet-gefractioneerde heparine in hoge doses* en van *heparine met laag moleculair gewicht* is niet aanbevolen.

Naar J. Stam et al.: Trombolysie voor het herseninfarct: het einde van het begin. *Ned. Tijdschr. Geneesk.* **144**, 1028-1032 (2000)

T. Brott et al.: Treatment of acute ischemic stroke. *New Engl. J. Med.* **343**, 710-722 (2000)

FLASHES

- Op 12 augustus 2000 werd een **koninklijk besluit** ondertekend betreffende de aflevering van geneesmiddelen die bepaalde **associaties van analgetica** bevatten (Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2000). De aflevering van volgende associaties zal aan een medisch voorschrift worden onderworpen:
- associaties van bepaalde niet-narcotische analgetica onderling;
 - associaties van één of meer niet-narcotische analgetica met per eenheidsdosis (b.v. per comprimé of gelule) 15 mg of meer codeïne (overeenkomend met ongeveer 19 mg codeïnefosfaat)

Een overgangperiode van één jaar vanaf de datum van publicatie in het staatsblad, is voorzien. Met deze maatregel hoopt men het misbruik van dergelijke preparaten tegen te gaan. In het begeleidend verslag aan de koning wordt gesteld dat voor een pijnstillend effect bij de volwassene minstens 23,5 mg codeïne (overeenkomend met 30 mg codeïnefosfaat) nodig is.

Het koninklijk besluit is te raadplegen via de website <http://www.staatsblad.be>

- Een arts vroeg ons meer uitleg over de “**3M Freeze Watch**”, die wordt geleverd bij een zending van bepaalde vaccins. Deze gadget geeft aan of het product waarmee het geleverd wordt (in dit geval een zending van vaccins), al dan niet bevroren geweest is. Dit is belangrijk om te weten, gezien de meeste vaccins hun doeltreffendheid verliezen bij bevriezen. Bij vriestemperatuur (< 0°C) gaat de in het buisje aanwezige zwarte vloeistof uitzetten, waardoor dit buisje barst en het witte papiertje zwart verkleurt.