

sclerotherapie van slokdarmvarices), en bij manipulatie van geïnfecteerd weefsel (b.v. een abscesdrainage).

### *Ingrepen ter hoogte van de mond en op de luchtwegen*

Antibioticaprofylaxis kan overwogen worden bij de hoogrisicopatiënten (cfr. supra) in geval van ingrepen met een belangrijke bacteriëmie (o.a. tandextracties, periodontale procedures en in het algemeen alle procedures die gepaard gaan met bloeding).

Naar E. Moonen et al.: Antibioticaprofylaxe bij patiënten met gewrichtsprothesen. *Tijdschr. voor Geneesk.* 56, 504-508 (2001)

---

## Lezersbrief

### MEDICAMENTEUZE BEHANDELING VAN DIABETISCHE GASTROPARESE

Naar aanleiding van het artikel “Medicamenteuze behandeling van diabetische gastroparese” verschenen in de Folia van april 2001, schreef een apotheker ons dat de in het artikel vermelde doses van metoclopramide en domperidon hoger zijn dan de maximale doses die in de bijsluiters worden vermeld (domperidon: 20 à 40 mg, 3 à 4 x per dag; metoclopramide: 5 à 20 mg 3 à 4 x per dag). In standaardwerken vindt men voor domperidon en metoclopramide inderdaad voor deze indicaties deze hoge doses. In dit verband wensen we eraan te herinneren dat, wanneer een arts beslist een geneesmiddel voor te schrijven buiten de aanbevelingen vermeld in de bijsluiters, hij daarvoor op medico-legaal vlak de verantwoordelijkheid draagt.

---

## FLASH

- De **Hoge Gezondheidsraad** adviseert het gebruik van catgut en van **medische hulpmiddelen** die dura mater van runderen bevatten, te verbieden. De Hoge Gezondheidsraad wenst ook een verbod van alle medische hulpmiddelen die weefsels van runderen, of derivaten ervan, bevatten (b.v. sommige hartkleppen en aorta-prothesen), voor zover er alternatieven bestaan. De bevoegde Europese autoriteiten stellen momenteel een lijst samen van alle hulpmiddelen die weefsels van dieren, of derivaten ervan, bevatten, en ze gaan na of er alternatieven beschikbaar zijn.