

[n.v.d.r.: gekenmerkt door o.a. koorts, agitatie, myoclonieën en meer zeldzaam convulsies, ventriculaire aritmie en uitgesproken hyperthermie, zie ook Folia januari 1996] niet uitgesloten worden bij gelijktijdig gebruik van sibutramine met andere middelen die het serotoninegehalte in de hersenen verhogen (b.v. selectieve serotonine-heropnameremmers, triptanen, dextromethorfan).

### **Plaats van sibutramine in de aanpak van obesitas**

De beste manier om gewicht te verliezen is het associëren van een licht hypocalorisch dieet (vermindering met 500 à 600 kcal/dag) aan een matige fysieke activiteit en/of gedragstherapie [zie ook Folia juni 1999]. Medicamenteuze behandeling (b.v. met sibutramine of orlistat) is enkel te overwegen bij falen van deze maatregelen bij personen met obesitas of met overgewicht geassocieerd aan risicofactoren [zie ook Folia juni 1999 en december 1998]. Voor deze geneesmiddelen is het effect op de morbiditeit of de mortaliteit niet bekend, en men dient daarenboven rekening te houden met de kostprijs.

Naar Sibutramine. Un peu de pression artérielle en plus pour quelques kilos en moins. *La Revue Prescrire* **21**, 405-412 (2001)

Sibutramine. Eénmaal daags, vederlicht ? *Pharma Selecta* **17**, 33-36 (2001)

### **Specialiteitsnaam**

Orlistat : Xenical

Sibutramine : Reductil

### **Nota van de redactie**

De auteurs van de artikels in *La Revue Prescrire* en *Pharma Selecta* relativeren sterk de plaats van sibutramine in de aanpak van obesitas gezien het geringe voordeel en gezien de risico's, in het bijzonder de verhoging van de arteriële bloeddruk. In het artikel "Orlistat in de aanpak van obesitas" in de Folia van december 1998 schreven we dat ook voor orlistat de plaats in de aanpak van obesitas niet duidelijk is.

---

## **FLASH**

- ➔ Een arts stelt ons volgende vraag. Bij zijn kleinkind van 4 maand stelt een pediater een lichte **otitis media** vast, en hij schrijft, waarschijnlijk terecht gezien de leeftijd van het kindje, een antibioticum voor. Daarnaast worden ook **Panotile oordruppels** aangeraden. De arts vraagt of iemand weet wat de zin is van bij een kind met otitis media, Panotile, een mengsel van een corticosteroïd (fludrocortisonacetaat), een lokaal anestheticum (lidocaïnehydrochloride), en twee antibiotica (neomycine en polymyxine B sulfaat), in te druppelen.