

zijn noodzakelijk om de plaats van desmopressine in de aanpak van de nierkoliek te kennen.

Naar E. Van Laecke en W. Oosterlinck: Pathofysiologie van de nierkoliek en de therapeutische implicaties ervan. *Tijdschr. voor Geneesk.* **52**, 1231-1234 (1996)

W. Oosterlinck en G. Villeirs: Diagnostiek en behandeling van nierkoliek. *Tijdschr. voor Geneesk.* **59**, 693-697 (2003)

N. Zabihi en J.M.H. Teichman: Dealing with the pain of renal colic. *Lancet* **358**, 437-438 (2001)

Nota van de redactie

Dit artikel bespreekt de aanpak van de pijn bij nierkoliek in de thuissituatie. In bepaalde omstandigheden is het evenwel aangewezen de patiënt te hospitaliseren, b.v. in geval van zwangerschap, één functionele nier, anurie, koorts boven de 38°C, of persisterende pijn ondanks adequate behandeling.

FLASH

- ➔ Het gebruik van **botulinetoxine** (BOTOX, DYSPORT) voor diverse therapeutische doeleinden werd reeds besproken in de Folia van juli 1995, juni 1999 en februari 2001. Naast enkele goed gestaafde indicaties zoals blefarospasme, strabisme, faciale en cervicale dystonie, functionele dystonie, bepaalde tremoren en axillaire hyperhydrosis wordt botulinetoxine ook meer en meer gebruikt voor andere indicaties (b.v. speekselvloed, anale fissuren, bepaalde types van hoofdpijn) waarvoor niet altijd degelijke gegevens bestaan. In de Verenigde Staten werd botulinetoxine recent aanvaard voor de behandeling van rimpels, naar aanleiding van de positieve resultaten van een groot-schalige, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie. De toenemende interesse voor botulinetoxine voor steeds meer indicaties mag niet uit het oog doen verliezen dat het gaat om een krachtig neurotoxine waarvan de langetermijneffecten niet gekend zijn [*Brit. Med. J.* **325**, 1188 (2002)]. De belangrijkste ongewenste effecten op korte termijn zijn: hoofdpijn, nausea, griepiger syndroom, zwaktegevoel en spierpijn. Er dient eveneens benadrukt dat een dergelijke behandeling zeer duur is, en dat blefarospasme, faciale en cervicale dystonie (spasmodische torticollis) en bepaalde vormen van functionele dystonie (b.v. talipes equinus) op dit ogenblik de enige in België aanvaarde indicaties zijn.