

[zie ook Folia januari 2003]. De exacte cholesterolwaarden vanaf dewelke na myocardinfarct een behandeling moet worden gestart, zijn niet duidelijk vastgelegd, maar de artikels waarop we ons voor dit artikel hebben gebaseerd, vermelden een totaal cholesterol gelijk aan of hoger dan 5 mmol/l (195 mg/dl). [N.v.d.r.: zie ook het artikel "Statines in de cardiovasculaire preventie: stand van zaken" in de Folia van juli 2004, waarin wordt vermeld dat voor de terugbetaling volgende waarden worden gebruikt: totaal cholesterol gelijk aan of hoger dan 190 mg/dl, of een LDL-cholesterol gelijk aan of hoger dan 115 mg/dl].

## Andere

Naast deze vier belangrijkste klassen, kunnen andere geneesmiddelen zoals de nitraten en de calciumantagonisten (vooral verapamil en diltiazem) nuttig zijn in de aanpak van symptomen van angor of van risicofactoren zoals hypertensie wanneer  $\beta$ -blokkers of ACE-inhibitoren niet verdragen worden. Met nitraten of calciumantagonisten werd echter geen effect op de mortaliteit aangetoond.

Naar H. Dalal et al.: Recent developments in secondary prevention and cardiac rehabilitation after acute myocardial infarction. *Brit. Med. J.* **328**, 693-697 (2004)

National Institute for Clinical Excellence ([www.nice.org.uk](http://www.nice.org.uk)) Clinical guideline A: prophylaxis for patients who have experienced a myocardial infarction (Review date: april 2003)

## Nota van de redactie

De plaats van orale anticoagulantia in de secundaire preventie van myocardinfarct werd besproken in het themanummer over antitrombotische behandeling [Folia februari 2004]: orale anticoagulantia zijn na myocardinfarct niet systematisch gerechtvaardigd maar kunnen overwogen worden bij patiënten met hoog risico van veneuze trombo-embolie, b.v. in geval van uitgebreid anteriorinfarct.

---

## FLASH

- ➔ Sinds 1 september 2004 wordt **RILATINE (methylfenidaat)** terugbetaald. De terugbetaling geldt enkel voor de comprimés aan 10 mg methylfenidaat, en dit voor de indicaties narcolepsie en aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis (ADHD). De terugbetaling is onderworpen aan bepaalde voorwaarden, met noodzaak van advies van de adviserend geneesheer. Het ministerieel besluit (17 augustus 2004) werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2004 (via <http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl>). In verband met methylfenidaat en aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis, zie ook Folia juli 2002.