

## BEHANDELING VAN IMPETIGO

Hoewel er geen consensus bestaat rond de optimale behandeling van impetigo, kan, om de genezing te bespoedigen, antibiotherapie overwogen worden. *Fusidinezuur lokaal toegediend* is dan de eerste keuze. Bij uitgebreide en ernstige vormen kan toediening van *flucloxacilline of cloxacilline langs orale weg* gedurende 7 dagen aangewezen zijn; een cefalosporine van de eerste groep of een neomacrolide zijn andere mogelijkheden in geval van allergie aan penicillines, maar resistentie tegen de macroliden beperkt momenteel sterk hun gebruik. Maatregelen om verspreiding van de infectie te vermijden, zijn aan te raden.

Impetigo is een zeer besmettelijke, bacteriële, oppervlakkige huidinfectie door *Staphylococcus aureus* en/of  $\beta$ -hemolytische streptokokken van groep A. Deze aandoening komt vooral voor bij zuigelingen en jonge kinderen. Impetigo wordt gekarakteriseerd door het optreden van kleine vesiculaire pustels die evolueren tot honinggeel-gekleurde korsten. In bepaalde gevallen kunnen grotere bulleuze letsels optreden (bulleuze impetigo). Impetigo gaat slechts zelden gepaard met algemene symptomen, en lokale en systemische complicaties zijn zeldzaam. Gegevens over de natuurlijke evolutie van deze aandoening ontbreken, en er bestaat geen consensus rond de optimale behandeling.

Het is niet bewezen dat antiseptica een gunstig effect hebben op de evolutie van impetigo. Het starten van een antibiotherapie leidt wel tot vluggere genezing maar het is niet bewezen dat een dergelijke behandeling het risico van recidieven en complicaties beïnvloedt.

- Bij lichte vormen van impetigo is, volgens de beschikbare gegevens, een lokale antibiotherapie op basis van *fusidinezuur* gedurende 7 dagen veilig en doeltreffend. *Mupirocine* is even doeltreffend, maar wordt best voorbehouden voor eradicatie van meticilline-resistente stammen van *Staphylococcus aureus* in de neusholten [zie Folia november 2002].
- Bij uitgebreide of ernstige vormen van impetigo wordt dikwijls de voorkeur gegeven aan antibiotherapie langs orale weg. Het is echter niet bewezen dat antibiotherapie langs orale weg doeltreffender is dan een lokale antibiotherapie, en de orale weg geeft meer risico van ongewenste effecten. Wanneer orale antibiotherapie overwogen wordt, is *flucloxacilline of cloxacilline* gedurende 7 dagen de eerste keuze.

Bij allergie aan penicillines gaat de voorkeur naar een *cefalosporine van de eerste groep*, maar men moet er zich van bewust zijn dat 10 % van de patiënten die allergisch zijn aan penicillines, dit ook zijn aan cefalosporines. De *neomacroliden* zijn een andere mogelijkheid in geval van allergie aan penicillines, maar de toenemende resistentie van bacteriën tegen

macroliden beperkt sterk hun gebruik. [N.v.d.r.: sommige experten stellen ook het gebruik van clindamycine voor in geval van allergie aan penicillines.]

Maatregelen om verspreiding van de infectie te vermijden, zoals thuis blijven van school of van de crèche, wassen van handen, nagels en kledij, zijn zeker aan te raden.

### Belangrijkste referenties

Anoniem. L'impétigo en bref. *La Revue Prescrire* 2000;20: 564-65

Anoniem. Interventions for impetigo (Cochrane Review). *The Cochrane Library*. Issue 3, 2004.

Sladden M, Johnston GA. Common skin infections in children. *BMJ* 2004; 329: 95-99

### Specialiteitsnamen

Cloxacilline: Penstaphon<sup>®</sup>

Flucloxacilline: Floxapen<sup>®</sup>, Staphycid<sup>®</sup>

Fusidinezuur: Fucidin<sup>®</sup>

Mupirocine: Bactroban<sup>®</sup>

---

## RECENTE INFORMATIE DECEMBER 2004 - JANUARI 2005

Voor de periode van december 2004 tot januari 2005, lijken volgende nieuwe specialiteiten ons interessant om te signaleren.

- **Solifenacine (Vesicare<sup>®</sup>)** is een nieuw urinair spasmolyticum met anticholinerge eigenschappen gebruikt bij blaasinstabiliteit.
- **Pregabalin (Lyrica<sup>®</sup>)** is een nieuw anti-epilepticum verwant aan gabapentine. Het product is aanvaard, bij de volwassene, voor de behandeling, in associatie met andere anti-epileptica, van partiële epilepsie met of zonder secundaire veralgemening, evenals voor de behandeling van perifere neuropathische pijn. Zijn doeltreffendheid en ongewenste effecten lijken vergelijkbaar met deze van gabapentine.
- **Fosamprenavir (Telzir<sup>®</sup>)**, een prodrug van amprenavir, is aanvaard voor de behandeling, in associatie, van HIV-infecties.
- **Temoporfine (Foscan<sup>®</sup>)** is een fotosensibiliserend agens gebruikt bij de behandeling van bepaalde gevorderde plaveiselcelcarcinomen van hoofd en hals.