

macroliden beperkt sterk hun gebruik. [N.v.d.r.: sommige experten stellen ook het gebruik van clindamycine voor in geval van allergie aan penicillines.]

Maatregelen om verspreiding van de infectie te vermijden, zoals thuis blijven van school of van de crèche, wassen van handen, nagels en kledij, zijn zeker aan te raden.

### Belangrijkste referenties

Anoniem. L'impétigo en bref. *La Revue Prescrire* 2000;20: 564-65

Anoniem. Interventions for impetigo (Cochrane Review). *The Cochrane Library*. Issue 3, 2004.

Sladden M, Johnston GA. Common skin infections in children. *BMJ* 2004; 329: 95-99

### Specialiteitsnamen

Cloxacilline: Penstaphon®

Flucloxacilline: Floxapen®, Staphycid®

Fusidinezuur: Fucidin®

Mupirocine: Bactroban®

---

## RECENTE INFORMATIE DECEMBER 2004 - JANUARI 2005

Voor de periode van december 2004 tot januari 2005, lijken volgende nieuwe specialiteiten ons interessant om te signaleren.

- **Solifenacine (Vesicare®)** is een nieuw urinair spasmolyticum met anticholinerge eigenschappen gebruikt bij blaasinstabiliteit.
- **Pregabalin (Lyrica®)** is een nieuw anti-epilepticum verwant aan gabapentine. Het product is aanvaard, bij de volwassene, voor de behandeling, in associatie met andere anti-epileptica, van partiële epilepsie met of zonder secundaire veralgemening, evenals voor de behandeling van perifere neuropathische pijn. Zijn doeltreffendheid en ongewenste effecten lijken vergelijkbaar met deze van gabapentine.
- **Fosamprenavir (Telzir®)**, een prodrug van amprenavir, is aanvaard voor de behandeling, in associatie, van HIV-infecties.
- **Temoporfine (Foscan®)** is een fotosensibiliserend agens gebruikt bij de behandeling van bepaalde gevorderde plaveiselcelcarcinomen van hoofd en hals.