



- Belgische commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid („Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee”):
  - Aanbeveling over acute blaasontsteking bij de vrouw (november 2001) via [www.health.fgov.be/antibiotics/ndl/cystitisaanb.pdf](http://www.health.fgov.be/antibiotics/ndl/cystitisaanb.pdf)
  - Aanbeveling over acute pyelonefritis bij volwassenen (augustus 2002) via [www.health.fgov.be/antibiotics/ndl/pyelonefritisaanb.pdf](http://www.health.fgov.be/antibiotics/ndl/pyelonefritisaanb.pdf)
- *Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH)*: aanbevelingen voor goede medische praktijkvoering over cystitis bij de vrouw (2000) via [www.wvvh.be/files/cystitis\\_ab.pdf](http://www.wvvh.be/files/cystitis_ab.pdf)
- Hooton TM: The current management strategies for community-acquired urinary tract infection. *Infect Dis Clin N Am* 2003; 17: 303-32
- Fihn S: Acute uncomplicated urinary tract infection in women. *New Engl J Med* 2003; 349: 259-66
- Cystite aiguë simple de la femme jeune. Un diagnostic par les plaintes spontanées. *La Revue Prescrire* 2003; 23: 532-34
- Vogel T, Verreault R, Gourdeau M, Morin M, Grenier-Gosselin L, Rochette L: Optimal duration of antibiotic therapy for uncomplicated urinary tract infection in older women: a double-blind randomized controlled trial. *Can Med Ass J* 2004;170: 469-473
- Jepson RG, Mihaljevic L, Craig J: Cranberries for preventing urinary tract infections (Cochrane Review). The Cochrane Library Issue 1, 2005
- Fiches modèles OMS d’information à l’usage des prescripteurs: Médicaments utilisés dans les infections bactériennes (2003)

## FLASH

- ➔ **Wat is de plaats van geneesmiddelen in de behandeling en preventie van parodontale aandoeningen?** Parodontale aandoeningen omvatten gingivitis (reversibele ontsteking van het tandvlees) en parodontitis (irreversibele vernietiging van het parodontium). De tandaanslag en de kiemen daarin aanwezig, spelen een belangrijke rol in het optreden van parodontale aandoeningen. Tabagisme, slecht gecontroleerde diabetes en immuundeficiëntie zijn eveneens belangrijke risicofactoren. De aanpak van parodontale aandoeningen bestaat in de eerste plaats uit het bestrijden van tandaanslag door het poetsen van de tanden (minstens eenmaal per dag), het kuisen van de interdentale ruimte, en regelmatige tandsteenverwijdering. Het is niet bewezen dat bepaalde stoffen die worden toegevoegd aan mondbaden of tandpasta’s een bijkomend voordeel bieden aan het poetsen van de tanden; chloorhexidine kan echter in sommige gevallen wel nuttig zijn, b.v. wanneer tanden poetsen moeilijk of onmogelijk is, maar het kan de tanden kleuren, en de smaakperceptie veranderen. Routinematig gebruik van antibiotica, lokaal of systemisch, is niet gerechtvaardigd, tenzij ter preventie van bacteriële endocarditis bij bepaalde ingrepen [zie Folia maart 2000]. [*La Revue Prescrire* 2003;23,841-45].

## ERRATUM

In de Folia van mei 2005, blz. 44 is een fout opgetreden in de verwijzing naar een artikel in *Drug and Therapeutics Bulletin*. De correcte verwijzing is 2005;43:1-6.