

struatiestoornissen, waterretentie en anemie; cyproteron is teratogeen (feminisatie van de mannelijke vrucht).

## Nota

- De combinatie van cyproteronacetaat (2 mg) + ethinylestradiol (0,035 mg) wordt cyclisch (21 dagen, met een interval van 7 dagen) gebruikt bij milde vormen van hirsutisme. Bij ernstige vormen wordt aan deze combinatie gedurende de eerste 10 dagen van de cyclus cyproteronacetaat toegevoegd in een dosis tot 50 mg per dag.
- Voor spironolacton zijn bij sommige proefdieren, in hoge doses, feminisatieverschijnselen bij de mannelijke vrucht gezien; gegevens bij de mens in dat verband ontbreken.
- Enkel voor de specialiteiten op basis van cyproteronacetaat + ethinylestradiol en voor één specialiteit op basis van cyproteronacetaat alleen (Androcur® 10 mg en 50 mg) wordt hirsutisme als indicatie in de bijsluiter vermeld (situatie op 1 juli 2006).

## Naar

Anoniem. Pilosité excessive chez les femmes. Différencier hypertrichose et hirsutisme. *La Revue Prescrire* 2006;26:116-22

Carmina E. A risk-benefit assessment of pharmacological therapies for hirsutism. *Drug Safety* 2001;24:267-76

Rosenfield R.L. Hirsutism. *New Engl J Med* 2005;353:2578-88

The Cochrane Database of Systematic Reviews.

- Cyproterone acetate for hirsutism. Abstract via [www.cochrane.org/reviews/en/ab001125.html](http://www.cochrane.org/reviews/en/ab001125.html)
- Spironolactone versus placebo or in combination with steroids for hirsutism and/or acne. Abstract via [www.cochrane.org/reviews/en/ab000194.html](http://www.cochrane.org/reviews/en/ab000194.html)

---

## Goed om weten

## COMPLICATIES NA INSPUITEN VAN DE PERMANENTE RIMPELVULLER DERMALIVE EN SOORTGELIJKE PRODUCTEN

[Reeds verschenen als Goed om weten-bericht op onze website op 18/8/2006]

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu vestigt de aandacht op mogelijke complicaties type granuloom, na inspuiten van de permanente rimpelvuller Dermalive en andere soortgelijke producten. Meer informatie is te vinden op de website van het directoraat-generaal Geneesmiddelen (via [www.health.fgov.be](http://www.health.fgov.be), klik “Geneesmiddelen”, bericht van 10/08/2006). Artsen en apothekers kunnen vermoede ongewenste effecten met deze producten melden via een gele fiche of via het e-mailadres [meddev@health.fgov.be](mailto:meddev@health.fgov.be)