

## Voorkamerfibrillatie

In een open label onderzoek (ACTIVE W) bij 6.706 patiënten met VKF en hoog risico van cerebrovasculair accident bleek behandeling met orale anticoagulantia werkzamer dan de combinatie van clopidogrel plus acetylsalicylzuur voor de preventie van vasculaire accidenten (o.a. cerebrovasculair accident). Wat betreft majeure bloedingen was er geen verschil tussen beide groepen; mineure bloedingen traden vaker op in de groep behandeld met anti-aggregantia. [*Lancet* 2006;367:1903-12]

## Zona

Een eenmalige epidurale injectie met corticosteroiden en analgetica heeft een matig effect op zoster-geassocieerde pijn in de eerste maand na optreden van herpes zoster, in vergelijking met gebruikelijke zorg (antivirale middelen en analgetica). Deze injectie had geen effect op de postherpetische neuralgie na 3 en 6 maanden. [*Geneesmiddelenbulletin* 2006;40:27;*Lancet* 2006;367:219-24]

Brivudine (Zerpex®) werd recent in België gecommmercialiseerd, voor gebruik tijdens de acute fase van zona bij immuuncompetente patiënten. In de bijsluiting stelt men voor brivudine 125 mg te starten binnen de 72 uur na het verschijnen van de eerste huidletsels en verder te zetten gedurende 7 dagen. Als ongewenst effect wordt vooral nausea vermeld. Brivudine mag zeker niet gecombineerd worden met fluorouracil en andere pyrimidine-analogen, omdat dit letale gevolgen kan hebben. [Zie ook *Folia* november 2006]

---

### Goed om weten

## VACCIN TEGEN ROTAVIRUS (ROTARIX®) VANAF 1 NOVEMBER 2006 TERUGBETAALD

[Reeds verschenen als Goed om weten-bericht op onze website op 26/10/2006] Vanaf 1 november 2006 wordt het vaccin tegen rotavirus (Rotarix®) in België terugbetaald. Voor meer informatie over het vaccin tegen rotavirus, zie *Folia* juli 2006 en september 2006. De terugbetalingsvoorwaarden zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2006 (Ministerieel besluit van 16 oktober 2006) zijn de volgende: “De specialiteit wordt vergoed indien ze voorgeschreven is voor de actieve immunisatie ter preventie van gastroenteritis veroorzaakt door een rotavirus infectie voor rechthebbenden jonger dan 6 maanden.”

Rotarix® wordt terugbetaald in hoofdstuk IV (d.w.z. na akkoord van de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling, dus “a priori controle”), in terugbetalingscategorie b. Het remgeld voor één verpakking voor een gewoon verzekerde bedraagt 10,40 euro, voor een verzekerde met voorkeursregeling 7,00 euro. Per kind kunnen twee verpakkingen worden terugbetaald. De vaccinatie tegen rotavirus bestaat inderdaad uit orale toediening van twee doses van het vaccin met een interval van minstens 4 weken.