

- Gezien het gebrek aan ervaring, wordt vaccinatie tijdens de zwangerschap vermeden.

[Reeds verschenen als Goed om weten-bericht op onze website op 5 december 2006.]

- Hoofdstuk 14.3. **Varenicline (Cham-pix®)**, een partiële agonist ter hoogte van bepaalde acetylcholinereceptoren, wordt voorgesteld ter vergemakkelijking van rookstop. Sinds december 2006 zijn in België “starter packs” (11 x 0,5 mg + 14 x 1 mg) en verpakkingen van 56 compr. à 1 mg beschikbaar. Studies suggereren dat varenicline doeltreffender zou zijn dan bupropion voor wat betreft het aantal patiënten dat na één jaar nog steeds niet rookt. Het is echter niet zeker dat dit bescheiden voordeel ook zal gezien worden in “real life”-omstandigheden. Er zijn geen vergelijkende studies met nicotinesubstitutie. De voornaamste ongewenste effecten van varenicline zijn gastro-intestinale, neurologische en psychische stoornissen, maar cardiale toxiciteit op lange termijn kan niet uitgesloten worden. Associëren van varenicline aan nicotine versterkt de ongewenste effecten van nicotine. [In verband met rookstop, zie Folia april 2000 en juli 2002, en de Transparantiefiche “Aanpak van rookstop”].

- **Evra®** is een anticonceptivum op basis van ethinylestradiol (0,6 mg) en norelgestromin (6 mg) voor transdermale toepassing: 1 applicatie om de 7 dagen gedurende 3 weken, gevolgd door een onderbreking van 7 dagen. Met dergelijke transdermale toepassing worden de piekplasmaconcentraties van het oestrogeen die men ziet met orale anticonceptiva, vermeden, maar de totale blootstelling per cyclus aan oestrogeen is hoger dan bij gebruik van een oraal anticonceptivum op basis van 35 µg oestrogeen. De Amerikaanse *Food and Drug Administration* berichtte recent over twee patiënt-controle studies die suggereren dat het **risico van veneuze tromboembolie** met Evra® hetzelfde (de ene studie) of zelfs hoger (de andere studie) is dan met een klassiek oraal anticonceptivum op basis van 35 µg oestrogeen [via www.fda.gov/cder/drug/infopage/orthoevra/default.htm]. De contra-indicaties en voorzorgen bij gebruik van een oraal anticonceptivum dienen dus ook in acht genomen te worden bij gebruik van Evra®, vooral bij vrouwen met risicofactoren voor veneuze tromboembolie.