

- Buflomedil (Buflomedil EG®, Buflo-memed®, Buflotop®, Docbuflome®, Kelomedil®, Loftyl®) wordt, zonder veel argumenten, voorgesteld voor gebruik bij claudicatio intermittens. In België is momenteel een **herevaluatie van de risico-batenverhouding van buflomedil** lopende. Deze werd gestart na terugtrekking in Frankrijk in november 2006 van de comprimés met buflomedil 300 mg omwille van twijfels over de veiligheid [via <http://agmed.sante.gouv.fr/hm/10/filtrpsc/lp061101.pdf>]. Geneesmiddelenbewakingsenquêtes in Frankrijk toonden meerdere meldingen van neurologische (myoclonieën, convulsies) en cardiale (hypotensie, hartritmestoornissen, hartstilstand) ongewenste effecten met buflomedil. Deze traden meestal op bij overdosering (accidenteel of vrijwillig) of bij niet respecteren van de aanwijzingen in de bijsluiter (bv. geen dosisreductie bij nierinsufficiëntie, niet respecteren van de contra-indicaties of overschrijden van de maximale dosering van 600 mg per dag).

Het is altijd noodzakelijk de risico's van een geneesmiddel af te wegen tegen de verwachte voordelen. Dit geldt des te meer

voor geneesmiddelen waarvoor er twijfels zijn omtrent hun doeltreffendheid: de auteurs van een recent overzichtsartikel in de *British Medical Journal* [2006;333:1002-5] stellen "dat er geen overtuigende evidentie is van enig significant effect van buflomedil op de symptomen van claudicatio intermittens".

- In de Folia werd reeds meerdere malen aandacht besteed aan de **interacties tussen Sint-Janskruid en geneesmiddelen** [Folia maart 2000 en oktober 2005]. In verband met anticonceptieve oestroprogestativa werd gewezen op de mogelijkheid van doorbraakbloedingen en mogelijk zelfs pilfalen met zwangerschap tot gevolg. Het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking ontving recent melding van een 36-jarige vrouw die als anticonceptivum **Nuvaring®** (vaginale ring op basis van ethinylestradiol en etonogestrel) gebruikte, en sinds ze een preparaat op basis van sint-Janskruid nam, doorbraakbloedingen vertoonde. Het is belangrijk ook voor de anticonceptieve oestroprogestativa voor parenteraal gebruik (vaginale ring, pleister) rekening te houden met interacties.