

korte termijn maar zijn doeltreffendheid en veiligheid op lange termijn zijn nog niet goed bekend. Men dient bedacht te zijn op het risico van soms ernstige ongewenste effecten zoals opportunistische infecties en hematologische stoornissen [zie Folia september 2005].

- In refractaire gevallen worden soms uitzonderlijke behandelingen zoals *thalidomide* of *transplantatie van autologe stamcellen* overwogen, maar uiterste voorzichtigheid is geboden omwille van hun gevreesde ongewenste effecten.

- *Nieuwe biologische middelen* zoals het hu- maan anti-IL6-receptor monoclonaal antilichaam, worden momenteel geëva- lueerd en tonen veelbelovende resultaten bij de ziekte van Still.

Naar

Hashkes PJ. en Laxer RM. Medical treatment of juvenile idiopathic arthritis. *JAMA* 2005; 294: 1671-84

NICE. Guidance on the use of etanercept for the treatment of juvenile idiopathic arthritis.

Via <http://www.nice.org.uk>

Recente informatie

JANUARI - FEBRUARI 2007

Het lijkt interessant het beschikbaar komen van volgende nieuwe specialiteiten te signaleren.

- Hoofdstuk 9.1.1.2. Een **vaccin tegen cholera (Dukoral®)** werd recent gecommmercialiseerd in België. Dit vaccin bevat *Vibrio cholerae* serogroep O1 bacteriën en het recombinante choleratoxine subunit B. Het vaccin geeft een partiële en tijdelijke bescherming tegen *V. Cholerae* serogroep O1, maar niet tegen *V. cholerae* serogroep O139 of andere vibrio-species. De plaats van dit vaccin is beperkt en de vaccinatie zal in principe enkel voorgesteld worden voor hulpverleners in vluchtelingenkampen waar er een risico is van cholera-epidemie.

- Hoofdstuk 14.12. **Lanthaan (Fosrenol®)** is, zoals sevelamer, een fosfaatchelator gebruikt om hyperfosfatemie bij gedialyseerde patiënten met chronische nierinsufficiëntie tegen te gaan. De ongewenste effecten zijn vooral gastro-intestinale stoornissen en hypocalcemie.

Het lijkt ons nuttig de **terugtrekking van de markt** van de enige specialiteit op basis van **tretinoïne voor lokaal gebruik (Retinova®)**, te signaleren. Tretinoïne lokaal wordt vooral gebruikt bij de behandeling van milde tot matige acne met comedonen [in verband met de behandeling van acne, zie Folia juli 2005], en bij de behandeling van foto-dermatosen ten gevolge van chronische blootstelling aan de zon. Tretinoïne lokaal kan magistraal voorgeschreven worden, bijvoorbeeld onder vorm van crème à 0,05%.

R/Tretinoïne 25 mg

Antioxidans q.s.

Anionische hydrofiele crème q.s. ad 50 g
Omwille van zijn teratogeniteit mag tretinoïne niet gebruikt of gemanipuleerd worden door een zwangere vrouw of een vrouw die wenst zwanger te worden, of gedurende de periode van borstvoeding.