

- Ook **indomethacine** (Dolcidium®, Indocid®) wordt soms gebruikt wegens zijn remmend effect op de prostaglandinesynthese (indicatie niet vermeld in de Belgische bijsluiter). Er zijn echter enkele belangrijke ongewenste effecten bij de moeder (o.a. thoracale pijn, dyspnoe, maag-darmporforaties en longoedeem) en de foetus (o.a. prematuur sluiten

van de ductus arteriosus, oligohydramnios) zodat het gebruik als tocolyticum in de meeste richtlijnen, zeker na 32 tot 33 zwangerschapsweken, niet meer ondersteund wordt.

Nota

De referenties bij dit artikel zijn te vinden op onze website www.bcfi.be

Recente informatie

- Hoofdstuk 10.6. **Panitumumab (Vectibix®▼)**, beschikbaar sinds september 2008) is een recombinant humaan monoklonaal IgG2-antilichaam, voorgesteld voor de behandeling van bepaalde vormen van gemetastaseerde colorectale kanker, na falen van de chemotherapie. De voornaamste ongewenste effecten zijn huidreacties, interstitiële pneumonie, hypomagnesiëmie, hypocalcemie.

- Hoofdstuk 10.7. **Nilotinib (Tasigna®▼)**, beschikbaar sinds september 2008) is een proteïnekinaseremmer (o.a. van bcr/ablnkinase) voorgesteld voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie met aanwezigheid van het Philadelphia-chromosoom bij patiënten bij wie andere behandelingen ondoeltreffend zijn of niet verdragen worden. De belangrijkste ongewenste effecten zijn huidrupties, gastro-intestinale stoornissen, beenmergplasie, verlenging van het QT-interval, verhoging van de lipasen. Het gaat om een weesgeneesmiddel.

- Hoofdstuk 10.9. **Trabectedine (Yondelis®▼)**, beschikbaar sinds september 2008) is een antitumoraal middel voorgesteld voor de behandeling van gevorderd weke-delensarcoom wanneer andere behandelingen falen of niet verdragen worden. De voornaamste ongewenste effecten zijn

hematologische en gastro-intestinale stoornissen, hepatotoxiciteit en rhabdomyolyse. Het gaat om een weesgeneesmiddel.

- Hoofdstuk 12.1.3. Een specialiteit op basis van **lidocaïne 5% in de vorm van een pleister voor transdermaal gebruik (Versatis®)**, beschikbaar sinds september 2008) wordt voorgesteld voor de behandeling van postherpetische neuralgie. De pijnlijke zone dient gedurende maximum 12 uur per 24 uur te worden bedekt met een pleister. [In verband met de medicamenteuze behandeling van postherpetische neuralgie, zie Folia april 2006 en Transparantiefiche "Aanpak van zona"].

- Hoofdstuk 12.1.5. Een associatie op basis van **benzoylperoxide en adapaleen (Epiduo®)**, beschikbaar sinds september 2008) wordt voorgesteld voor de behandeling van acne. Let op: adapaleen is een retinoïd, en het gebruik ervan is gecontra-indiceerd bij zwangere vrouwen of vrouwen die plannen zwanger te worden. [In verband met de behandeling van acne, zie Folia juli 2005].

- Hoofdstuk 13.2. **Gadofosveset-trinatrium (Vasovist®▼)**, beschikbaar sinds september 2008) is een gadoliniumderivaat gebruikt bij angiografie door magnetische resonantie.