

- 8.1.1.2.2. **Cefactor**, een cefalosporine van de tweede groep, is opnieuw beschikbaar als specialiteit (**Doccefacro®**, beschikbaar sinds oktober 2008).
- 8.4.3.7. **Raltegravir (Isentress®▼)**, beschikbaar sinds oktober 2008) is een antiretroviraal middel van een nieuwe klasse: de integrase-inhibitoren. Integrase is een enzym van het HIV-virus, noodzakelijk voor de integratie van het virale DNA in het menselijk DNA. Raltegravir moet gebruikt worden in associatie met andere

antiretrovirale middelen. De voornaamste ongewenste effecten zijn duizeligheid, vermoeidheid, gewrichtspijn, gastro-intestinale stoornissen en huidrupties. Zoals voor de andere antiretrovirale middelen vertoont raltegravir een belangrijk risico van interacties, bv. met rifampicine, de inhibitoren van de maagzuursecretie en de antacida, en het is daarom belangrijk meer gedetailleerde bronnen te raadplegen, bv. [www.hiv-druginteractions.org](http://www.hiv-druginteractions.org)

## Medegedeeld door het Centrum voor Geneesmiddelenbewaking

### HIK VAN MEDICAMENTEUZE OORSPRONG

Bij hik is er een bruske contractie van de inadamingsspieren, gevolgd door sluiting van de stemspleet; dit laatste is de oorzaak van het kenmerkend geluid. De oorzaken van hik zijn uiteenlopend, bv. slokdarmstoornissen, cerebrale stoornissen, infectieuze of metabole aandoeningen. De hik kan ook, zij het zelden, van medicamenteuze oorsprong zijn. In *La Revue Prescrire* [2008;28:291-2] werd recent aandacht besteed aan de geneesmiddelen die de hik kunnen veroorzaken. Volgende geneesmiddelen werden in verband gebracht met hik.

- De *corticosteroiden*.
- De *benzodiazepines*: lormetazepam, lorazepam en intraveneus midazolam.
- Bepaalde *antibiotica*: ceftriaxon, imipenem + cilastine, sulfamiden; hik ten gevolge van slokdarmulceratie door amoxicilline,

doxycycline [zie ook Folia juli 2000] of co-trimoxazol, is gerapporteerd.

- De *anti-emetica* ondansetron (dikwijls in associatie met een corticosteroid) en aprepitant.
- De *anti-epileptica* ethosuximide en fenobarbital.
- *Andere geneesmiddelen* zoals nicotine in de vorm van kauwgom, etoposide, methyl-dopa, bepaalde antidepressiva en opiaten, amifostine, doxapram. De hik is ook een van de ongewenste effecten van algemene anesthesie, zonder dat een verband met een welbepaald anestheticum aangetoond is.

Bij aanhoudende hik is het aangeraden ook te denken aan een geneesmiddel als oorzaak, en, indien mogelijk, de evolutie van de hik op te volgen na stoppen van het verdachte geneesmiddel. Hierdoor kunnen onnodige onderzoeken worden vermeden.