

- **Fenticonazol (Gynoxin®▼)**; hoofdstuk 12.5.) is een nieuw antimycoticum voor vaginaal gebruik, voorgesteld bij de behandeling van vulvovaginale candidose. Fenticonazol wordt praktisch niet geresorbeerd en, zoals de andere antimycotica voor vaginaal gebruik, zijn er lokale reacties als ongewenste effecten. De hulpstoffen kunnen de latex van condooms en

diafragmas aantasten, waardoor de anticonceptieve doeltreffendheid en de bescherming tegen seksueel overdraagbare infecties afnemen.

Andere nieuwe geneesmiddelen met symbool ▼: Zarzio® (filgrastim, hoofdstuk 10.9.1.), Azzalure (botulinetoxine type A, hoofdstuk 14.4.).

---

## CORRECTIES IN HET GECOMMENTARIEERD GENEESMIDDELENREPERTORIUM EDITIE 2010

- Hoofdstuk 1.10., blz. 96, **Haemate P®**: de dosering van factor van Willebrand - Rcof bedraagt respectievelijk **1.200 IE** en **2.400 IE** (en niet 1.100 IE en 2.200 IE).

- Hoofdstuk 8.1.5.5., blz. 326, **clindamycine**: de dosis per os voor kinderen moet zijn 8 à **25 mg/kg/dag** in 3 à 4 giften (en niet 8 à 40 mg/kg/dag).

- Hoofdstuk 8.2.3., blz. 337, **itraconazol**: de dosis bij vulvovaginale candidose moet zijn 2 x **200 mg** met 12 uur interval (en niet 2 x 400 mg).

- Hoofdstuk 12.2.10., blz. 447, **Macugen®** (pegaptanib) spuitamp. in situ. Lees: 1 x 0,3 mg/90 **µl** (en niet 0,3 mg/90 l).

N.B. Er was recent enige verwarring rond de in de papieren versie van het Repertorium gebruikte uitdrukking "Andere benaming(en)": een lezer interpreteerde dit als onderling uitwisselbare geneesmiddelen. Dit is niet het geval. Zoals uitgelegd in de Inleiding van het Repertorium (blz. 21) worden hiermee de andere specialiteiten met eenzelfde actief bestanddeel aangeduid, ook al verschillen deze in dosering en/of farmaceutische vorm.

---

## Medegedeeld door het Centrum voor Geneesmiddelenbewaking

### TENDINOPATHIE EN STATINES

Het is goed bekend dat statines myalgie kunnen veroorzaken, met risico van rhabdomyolyse. Met statines zijn ook gevallen van tendinopathie gerapporteerd, hoewel veel minder frequent. Tendinopathie lijkt niet te zijn gerapporteerd in de klinische studies uitgevoerd vóór de registratie, maar werd gesignaleerd in het kader van spontane geneesmiddelenbewaking. In *La*

*Revue Prescrire* [2010;30:29-30] werd recent de stand van zaken gegeven in verband met dit ongewenst effect. Uit een analyse van de spontane meldingen in Frankrijk blijkt dat er tussen 1990 en 2005, 115 gevallen van tendinopathie gerapporteerd werden tijdens de behandeling met een statine. In ongeveer 60 % van de gevallen trad tendinopathie op gedurende het