

ARTIKELS

Rationeel gebruik van antibiotica bij acute luchtweginfecties in de eerste lijn

Een rationeel gebruik van antibiotica bij luchtweginfecties is één van de pijlers van de aanpak van de resistentieproblematiek. Vandaar onze jaarlijkse aandacht voor dit onderwerp. Dit jaar is er in het bijzonder aandacht voor het juryrapport van de consensusvergadering "Het rationeel gebruik van antibiotica bij het kind in de ambulante zorg" (RIZIV, 2016), voor de plaats van antibiotica bij kinderen met otitis media met effusie, voor de plaats van antibiotica bij acute bronchitis en voor de recente discussie over de duur van antibioticumkuren.

Vaccinatie tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap: een update

De aanbeveling om aan zwangere vrouwen een herhalingsinenting tegen kinkhoest toe te dienen (tussen de 24^{ste} en 32^{ste} zwangerschapsweek, en dit bij elke zwangerschap), wordt versterkt door de resultaten van recent gepubliceerde observationele studies. Deze studies tonen bij de jonge zuigeling een daling van de incidentie van kinkhoest en een gunstige impact op de morbiditeit en mortaliteit door kinkhoest, indien de moeder werd gevaccineerd tijdens de zwangerschap.

Commentaar: is glycerol een werkzaam hoestmiddel bij kinderen?

Commentaar: controversie over de uitbreiding van de indicaties van empagliflozine

NPS Medicinewise (een Australische organisatie van onafhankelijke informatie gelijkaardig aan het BCFI) vestigt de aandacht op een aantal bijkomende beperkingen bij de analyse van de EMPA-REG-studie met empagliflozine.

RECENTE INFORMATIE: september 2017



Nieuwigheden in de oncologie

- elotuzumab



Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde

- lonococog alfa



Schrappingen

- urofollitropine
- doxepine

GENEESMIDDELENBEWAKING

Vaccinatie tegen rotavirus en risico van intestinale invaginatie: een update

Deze maand in de Folia

Jaarlijks wordt in de Folia van oktober de aandacht gevestigd op het belang van rationeel gebruik van antibiotica bij acute luchtweginfecties. De gegevens die beschikbaar zijn om aanbevelingen rond antibioticagebruik voor de Belgische regio op te baseren laten slechts toe om hieruit een zogenaamde expertenconsensus te formuleren. Dit maakt dat hetzelfde bronmateriaal soms tot licht afwijkende adviezen aanleiding kan geven naargelang de interpretatie of voorkeur van de betrokken redactie. Er ontbreken bijvoorbeeld immers vaak gegevens rond regionale resistentiecijfers bij de patiënten die tot de doelgroep behoren, in casu patiënten in de ambulante setting. Verder zijn er bijvoorbeeld ook niet altijd vergelijkende studies die toelaten om een optimale behandelingsduur te definiëren. Anderzijds is er bij de artsen en apothekers een sterke vraag naar concrete richtlijnen en om daaraan tegemoet te komen baseert het BCFI zich voor haar publicaties als primaire bron op de aanbevelingen van het BAPCOC uit de "Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk".

De huidige (geïnactiveerde) vaccins tegen kinkhoest hebben slechts een korte beschermingsduur. Er zijn dus bijkomende maatregelen nodig om de meest kwetsbare groep, namelijk de jonge, nog niet (volledig) gevaccineerde zuigeling, te beschermen. In dit Folia-nummer wordt geëvalueerd hoe vaccinatie tijdens de zwangerschap hier kan toe bijdragen.